

核准日期: 2016年10月25日
修订日期: 2021年01月15日 2025年11月25日



吸附破伤风疫苗说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称: 吸附破伤风疫苗

英文名称: Tetanus Vaccine, Adsorbed

汉语拼音: Xifu Poshangfeng Yimiao

【成分和性状】本品系用破伤风梭状芽孢杆菌菌种,在适宜的培养基中培养产生的毒素经精制、甲醛脱毒,并加入氢氧化铝佐剂制成。为乳白色均匀混悬液,长时间放置佐剂下沉,溶液上层应无色澄明,但经振摇后能均匀分散。本品不含防腐剂。

有效成分: 破伤风类毒素

辅料: 氢氧化铝 磷酸二氢钾 磷酸氢二钠 氯化钠

【接种对象】主要是发生创伤机会较多的人群,妊娠期妇女接种本品可预防产妇产及新生儿破伤风。

【作用与用途】本品接种后,可刺激机体产生体液免疫应答。用于预防破伤风。

【规格】每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。

【免疫程序和剂量】上臂三角肌内注射,每1次人用剂量0.5ml。

(1) 无破伤风类毒素免疫史者应按下表方法进行全程免疫。

项 目	年 份	针 次	剂量/ml
全程免疫	第1年	第1针,间隔4~8周接种第2针	0.5
	第2年	注射1针	0.5
加强免疫	一般每10年加强注射1针,如遇特殊情况也可5年加强1针。		

(2) 经全程免疫和加强免疫人员,自最后1次注射后3年以内受伤时,不需注射本品。超过3年者,用本品加强注射1次。严重污染的创伤或受伤前未经全程免疫者,除注射本品外,可酌情在另一部位注射破伤风抗毒素或破伤风人免疫球蛋白。

(3) 用含破伤风类毒素的混合制剂做过全程免疫者,以后每10年用本品加强注射1针即可。妊娠期妇女可在妊娠第4个月注射第1针,6~7个月时注射第2针,每次注射0.5ml。

【不良反应】注射本品后局部可出现红肿、疼痛、发痒或有低热、疲倦、头痛等,一般不需处理即自行消退。

【禁忌】

- 1.患严重疾病、发热者。
- 2.有过敏史者。
- 3.注射破伤风类毒素后发生神经系统反应者。

【注意事项】

- 1.使用时应充分摇匀,如出现摇不散的凝块、异物、疫苗瓶有裂纹或标签不清者,均不得使用。
- 2.注射后局部可能有硬结,1~2个月即可吸收,注射第2针时应换另侧部位。
- 3.应备肾上腺素等药物,以备偶有发生严重过敏反应时急救用。接受注射者在注射后应在现场观察至少30分钟。
- 4.严禁冻结。

【贮藏】于2~8℃避光保存和运输。

【包装】注射液用溴化丁基橡胶塞、中硼硅玻璃管制注射剂瓶,1瓶/盒。

【有效期】36个月。

【执行标准】YBS00232016,《中国药典》2025年版

【批准文号】国药准字S20160004

【上市许可持有人】

持有人名称:成都欧林生物科技股份有限公司

持有人地址:成都高新区天欣路99号

【生产企业】

企业名称:成都欧林生物科技股份有限公司

生产地址:成都高新区天欣路99号

邮政编码:611731

电话号码:028-69361111

传真号码:028-69361100

网址: www.olymvax.com

疫苗接种咨询热线:400-9687-119